

ニトロペン舌下錠0.3mgを使用される方へ

バルデナフィル塩酸塩水和物(勃起不全治療剤)、リオシグアト(肺高血圧治療剤)、シルデナフィルクエン酸塩(勃起不全治療剤、肺動脈性肺高血圧症治療剤)、タダラフィル(排尿障害治療剤、肺動脈性肺高血圧治療剤、勃起不全治療剤)を服用している場合は、主治医又は薬剤師に相談して下さい。


使用方法

- この薬は飲みこまないで舌の下において下さい。
(飲みこむと効果がなくなります)
- アルミ包装より1錠とり出し、舌の下において溶かして下さい。口の中が乾いて溶けにくいときは、水で舌を湿らせるか、かみくだいて舌の下において下さい。



狭心症における使い方

- 発作時の対応(本剤の使用及び救急車の要請等)については、主治医と相談して下さい。
- 効果は通常1～2分であらわれますが効果があらわれないときは、さらに1錠舌の下において下さい。さらに数分間たっても効果があらわれないときは、もう1錠舌の下において下さい。
(1回の発作には3錠まで)



使用するときの注意

- この薬を使用すると、ときに血圧が下がりすぎて立ちくらみやめまいを起こすことがあります。使用するときは立ったままでなく、座って使用して下さい。
- 立ちくらみやめまいで気分が悪くなったときは、足を高くして横になるか、座って頭を低くして回復するのを待って下さい。



このような
姿勢で回復するのを
待ってください!



腰掛けるか
座って
使用を…



- 一時的に頭痛が起きたり、顔やからだがかぼつたり、ドキドキしたりすることがありますが、このような症状はしだいに軽くなります。ただし、これらの症状がおさまらなかったり、ひどいときは、主治医に相談して下さい。
- 頭痛、めまいなどで、注意力、集中力の低下が起こることがあります。自動車の運転等の危険をとまなう機械の操作はしないで下さい。

保管上の注意

- 必ずアルミ包装のまま、携帯・保管して下さい。(他の容器には移しかえないで下さい)。アルミ包装が破れたりシワシワになった場合には、新しいものを使用して下さい。錠剤がつぶれることがありますので、ズボンの後ろポケットには入れないようにして下さい。
- 室温で保管して下さい。
冷蔵庫に入れる必要はありません。
必ず、幼児の手の届かないところへ保管して下さい。
- 狭心症の発作は、いつ、どこで起きるかわかりません。
常に携帯するだけでなく、職場や家庭の各場所にも何錠か置いておいて下さい。
- アルミ包装に表示されている使用期限を守って下さい。

